



**ESPÈCE
PROTÉGÉE**
INTERDIT DE
CAPTURER
OU TUER

Fauvette PITCHOU

Sylvia undata

TAILLE

12-14 cm

FORME, ALLURE

La fauvette pitchou a des ailes courtes et une longue queue. Elle voltige assez bas avec la queue dressée au moment de se poser.

Le mâle présente un plumage à coloration plus vive que celui de la femelle. Le dos est gris foncé et la gorge, la poitrine et les flancs sont rouge vineux. Le contour des yeux est rouge.

COMMENT L'IDENTIFIER ?



QUAND ?

> Toute l'année

OÙ ?

- > Landes d'ajoncs
- > Landes de bruyères

Écoutez son chant >



Son cri est le meilleur indice de présence car elle est difficile à bien voir.

PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ

7 ans

ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Elle se nourrit d'insectes en été, et de graines et baies en hiver.

La fauvette pitchou est sédentaire avec quelques mouvements après la reproduction.

La saison de reproduction a lieu au printemps. Deux couvées de 3 à 5 œufs sont produites chaque année, une première début mai, puis une seconde en juin ou juillet. Les poussins nidicoles sont élevés par les deux parents et nourris avec des insectes.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

Localement, la sur-fréquentation humaine qui engendre des problèmes de piétinement a pour effet de fragmenter l'habitat de la fauvette pitchou. D'autre part, le défrichement à visée agricole ou les feux couvrant de vastes superficies de landes peuvent être dommageables à l'espèce. Mais d'une manière générale, la fermeture des milieux en forêts la prive de nombreux habitats.

Pour éviter que les landes évoluent en un stade forestier, le gyrobroyage peut présenter un intérêt, de même que le brûlage dirigé. Le pâturage peut bien évidemment participer au maintien de ces habitats. Enfin, la fréquentation humaine portant atteinte à la qualité des habitats doit être maîtrisée.