



PHANÉROPTÈRE COMMUN

Phaneroptera falcata

TAILLE

35 mm avec les ailes

FORME, ALLURE

Le Phanéroptère commun est une sauterelle verte d'allure très élancée, avec une fine ponctuation foncée et légèrement tacheté de roux.

Les ailes sont nettement plus longues que le corps et les antennes sont longues comme quatre fois son corps.

COMMENT L'IDENTIFIER ?



QUAND ?

> De juillet à octobre

OÙ ?

- > Buissons et arbustes
- > Carrières
- > Friches
- > Pelouses sèches



Confusion possible avec le **Phanéroptère méridional** et la **Grande sauterelle verte**.

PRÉSENTATION

ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Il est essentiellement herbivore.

Après la reproduction, les femelles déposent leurs œufs dans des feuilles d'arbustes, notamment de prunellier, qu'elles scarifient à l'aide de leur oviscapte. Les œufs hivernent, puis éclosent en juin. Les larves atteignent le stade adulte après 6 mues.

Le son du Phanéroptère commun est très faible, il n'est pas audible au-delà d'un mètre.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

Lorsqu'il est inquiet, le Phanéroptère commun peut voler jusqu'à plusieurs mètres. Il est aussi capable de parcourir de longues distances, surtout par temps chaud, où il manifeste un maximum d'activité.

Il semble être vulnérable à l'intensification de l'agriculture, aux pesticides et à l'expansion des zones urbanisées. Le phanéroptère commun est une espèce indicatrice des milieux secs.