



BOUSCARLE DE CETTI

Cettia cetti

TAILLE

14 cm


FORME, ALLURE

La Bouscarle de Cetti présente un plumage brun roux sur le dessus et blanc terne sur le dessous, avec le bout des ailes et de la queue plus foncés. Elle possède un étroit sourcil clair et le contour des yeux foncé.

Remuante, elle agite la queue et les ailes et se déplace souvent la queue levée.

ESPÈCE
PROTÉGÉE
INTERDIT DE
CAPTURER
OU TUER

COMMENT L'IDENTIFIER ?



QUAND ?

> Toute l'année

OÙ ?

Zones humides riches en :

- > Buissons
- > Haies
- > Bosquets

Écoutez son chant >



Confusion possible avec la **Locustelle lusciniöide**.

Elle est difficile à apercevoir, mais a un chant explosif caractéristique.

PRÉSENTATION

LONGÉVITÉ

5 ans

ÉCOLOGIE DE L'ESPÈCE

Elle se nourrit de petits insectes.

La Bouscarle de Cetti pratique fréquemment la polygamie.

La femelle fait généralement deux nichées successives. Elle pond 3-4 œufs de couleur brique et assure la couvaison pendant 2 semaines. Les jeunes restent dans le nid environ 15 jours et dépendent des adultes encore une quinzaine de jours après leur envol.

BESOINS, MENACES ET ENJEUX

La Bouscarle de Cetti est relativement commune et sa population semble être en augmentation. Cette espèce sédentaire, migratrice occasionnelle des régions froides, semble ne pas être impactée par le changement climatique.

La Bouscarle de Cetti est surtout inféodée aux zones humides.